

ボツリヌス治療に関する説明書・同意書

歯科におけるボツリヌス治療は、ボツリヌス菌から抽出される天然のたんぱく質を緊張する筋肉に注射することで、一時的に筋肉の緊張をほぐし、歯ぎしり、食いしばり、不随意運動の緩和、咬筋肥大、ガミースマイルの改善などの効果をもたらすことから、咬合力コントロールの目的で筋緊張緩和の治療に使用されています。

【歯科ボツリヌス治療における注意点】

1. 数か所に注射をするため、注入時はチクとした痛みを感じたり、注入部位に押されるような感覚がある場合がございます。
2. 施術後の効果の現れ方には個人差がございますが、効果は早い方で2～3日で現れ始め、1週間～10日間で効果がピークに達します。
3. 長期間にわたり治療を継続した場合、人によっては抗体産生により効果が表れにくくなる場合があります。
4. 施術後の持続効果ですが、約3か月～6か月です。
5. 施術後注入部位に多少の赤みや腫れ、内出血が生じる場合があります。赤みや腫れなどは時間とともに消退します。
6. 施術当日の化粧、飲酒、長時間の入浴は避け、注入部位は強く揉まないでください。
(洗顔はこすらずやさしくおこなってください)
7. 次の方は禁忌のため、ボツリヌス治療をおこなうことができませんので、当てはまる方は主治医にお申し出てください。
 - (1) 全身性の神経筋接合部の障害をお持ちの方
 - (2) ボツリヌストキシンに対し過敏症の既往歴のある患者
 - (3) 妊婦又は妊娠の可能性のある方及び授乳中の方
(妊娠する可能性のある方は、ボツリヌス治療中及び最終投与後2回の月経を経るまで避妊する必要があります。男性は少なくとも3か月避妊して下さい)

上記の事項をご理解、ご納得頂いた上で施術を希望される方は、下記にご署名下さい。

私は歯科医師、歯科衛生士より上記注意事項の説明を受け、十分に理解、納得した上で、ボツリヌス治療を受けることに同意致します。

同意日 年 月 日

お名前

ご住所

電話番号